

## Wirtschaftsvolk (& Maischwarm)

### Drohnenrahmen schneiden

so oft wie möglich,  
je öfter, desto besser



### Gemülldiagnose (3-tägig) durchführen

Bei natürlichem Milbenfall von  
**über 10 Varroa/Tag:**  
eine gut wirksame Kurzzeit-Behandlung mit  
**Ameisensäure** durchführen

Wenn unter 10 Varroa/Tag, NICHT  
behandeln, so Brut und Bienen schonen!

sondern  
entweder  
**„Teilen &  
Behandeln“**  
= noch spät  
Völker  
vermehrten,  
Varroa-  
Behandlung  
mit Oxalsäure

oder  
**Abwarten** bis Mitte August  
sodann **Start Spätsommerpflege**  
= Einengen durch Entnahme des  
unteren Brutraums (Waben-  
hygiene), direkt folgend eine gut  
wirksame AS-Kurzzeit-  
Behandlung, danach Einfütterung

### Gemülldiagnose (3-tägig) durchführen

Bei natürlichem Milbenfall von  
**über 5 Varroa/Tag:**  
eine weitere gut wirksame Kurzzeit-Behandlung mit  
**Ameisensäure** durchführen

### Gemülldiagnose (3-tägig) durchführen

Bei Milbenfall  
von **über 1 Varroa/Tag:**  
Restentmilbung  
durch **Oxalsäure tröpfeln**  
sonst keine  
Behandlung nötig



## Ableger

April  
bis  
Juli

in brutfreier Phase  
mit **Milchsäure**  
einsprühen



Ende  
Juli

### Gemülldiagnose durchführen

Bei natürlichem Milbenfall von  
**über 5 Varroa/Tag:**  
eine gut wirksame Kurzzeit-  
Behandlung mit **Ameisensäure**  
durchführen

Wenn unter 5 Varroa/Tag, NICHT  
behandeln, so Brut und Bienen  
schonen!

ab  
Mitte  
Au-  
gust

Bis Anfang September weiterhin  
nur etwas füttern, entwickeln und  
Waben ausbauen lassen.  
Dann Winterauffütterung.

Mitte  
Sept

### Gemülldiagnose durchführen

Bei natürlichem Milbenfall von  
**über 1 Varroa/Tag:**  
eine gut wirksame Kurzzeit-  
Behandlung mit **AS** durchführen

Ende  
Nov bis  
Mitte  
Dez

### Gemülldiagnose durchführen

Bei **über**  
**1 Varroa/Tag:**

Restentmilbung  
durch **OS**  
tröpfeln

sonst keine  
Behandlung nötig

